



CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO CON TOSSINA BOTULINICA

Lo scopo del seguente modulo di consenso è di fornire al paziente, in aggiunta al colloquio pretrattamento con il Medico, le informazioni riguardanti le caratteristiche ed i rischi connessi al trattamento con tossina botulinica.

La preghiamo pertanto di leggere quanto segue, di chiedere al Medico qualsiasi chiarimento e quindi di firmare questo documento come conferma di aver ben compreso le informazioni ricevute.

Le rughe lineari di espressione possono essere attenuate, o talvolta eliminate, mediante il trattamento con tossina botulinica, che elimina o riduce la componente muscolare dinamica implicata nella loro genesi.

Tale effetto si evidenzia dopo alcuni giorni dal trattamento (3-4 gg) ed è massimo dopo circa un mese dall'iniezione, riducendosi lentamente fino a scomparire dopo circa 6-7 mesi.

DEFINIZIONE

La Tossina Botulinica è, come dice il nome stesso, una neurotossina capace di inibire la trasmissione dell'impulso nervoso. Il trattamento con tossina botulinica provoca quindi un blocco della trasmissione nervosa, quindi il muscolo responsabile della formazione delle rughe d'espressione, prevalentemente a livello frontale e perioculare, non si contrae più.

L'effetto che ne risulta è quello di un rilassamento muscolare temporaneo. Il recupero della funzione del muscolo dipende dalla velocità alla quale la tossina viene metabolizzata ed è soggettiva.

Si applica mediante microiniezioni nella zona dei muscoli da rilassare e le quantità sono molto piccole (microlitri), per cui il rischio di un avvelenamento sistemico è nullo.

QUALI RISULTATI PUO' DARE LA TOSSINA BOTULINICA?

- 1) Riduce o elimina temporaneamente le rughe di espressione e dinamiche

QUALI RISULTATI NON PUO' DARE?

- 1) Non migliora le rughe non di espressione, che devono essere corrette con altri trattamenti (filler o lifting)

QUALI SONO LE POSSIBILI COMPLICANZE DEL TRATTAMENTO?

Anche la tossina botulinica, come ogni altra terapia medica o chirurgica, potrebbe generare complicazioni che, seppur poco frequenti, debbono essere conosciute.

I possibili problemi sono:

- reazioni allergiche alla tossina o agli eccipienti (tali reazioni hanno luogo nei giorni immediatamente successivi al trattamento e sono transitorie
- ptosi palpebrale, diplopia, ectropion, ipocorrezione o ipercorrezione del difetto con conseguente riduzione della mimica e dell'espressività facciale (tali complicanze sono comunque temporanee)
- emicranie, debolezza muscolare, dolore al volto, eritema (in genere tutti esiti di gravità minima o moderata)
- raramente si può verificare: tensione della pelle, parestesia, nausea, vertigini, spasmi muscolari, blefarite, dolore all'occhio, sindrome influenzale, edema, astenia, febbre, reazione fotosensibile, prurito, secchezza della pelle, disturbi della vista, ansia, secchezza orale, infezioni (tali complicanze sono anch'esse di

- gravità minima o moderata)
- possibile dipendenza psicologica: il paziente si sente depresso se non rinnova il trattamento alla scomparsa degli effetti, soffrendo il ritorno ad un aspetto meno giovanile.

PRIMA DEL TRATTAMENTO

- Informare il Medico di qualsiasi eventuale terapia con farmaci (soprattutto antibiotici amino glicosidi,, spectinomicina, rilassanti di tipo muscolare-tubocurarina, cortisonici,contraccettivi, antiipertensivi, cardioattivi, anticoagulanti, ipoglicemizzanti, tranquillanti, sonniferi, eccitanti,ecc.)
- Segnalare le allergie, in particolare quelle ai farmaci ed ai cosmetici
- Segnalare la presenza di patologie quali: disordini neuromuscolari periferici, miastenia grave, sclerosi laterale amiotrofica, sindrome di Eaton-Lambert
- Segnalare un'eventuale gravidanza ed allattamento

Il giorno del trattamento struccare accuratamente il viso, **togliere il mascara dalle ciglia**

COSA BISOGNA FARE DOPO IL TRATTAMENTO CON TOSSINA BOTULINICA?

- Seguire scrupolosamente le indicazioni del medico, inoltre se esposto ad UV usare una fotoprotezione alta 50+
- Evitare di strofinarsi o massaggiare la parte trattata
- Evitare di sdraiarsi con la faccia in giù e possibilmente di non portare occhiali che premano sulla zona inoculata nelle 3-4 ore successive al trattamento
- Evitare attività fisica che possa dare vasodilatazione (palestra o sauna) nelle 24 ore successive
- Avvertire il Medico al minimo dubbio o problema inerente il trattamento.

Io sottoscritto.....data di nascita.....

DICHIARO di aver letto tutto il protocollo di consenso informato, che il trattamento con tossina botulinica mi è stato illustrato nei dettagli dal Medico e ritengo di averne compreso gli scopi , i limiti e le possibili reazioni avverse.

AUTORIZZO la Dr.ssa Romano Ilaria ad eseguire il trattamento con la tossina botulinica.

ACCETTO di sottopormi alle eventuali terapie mediche che mi verranno prescritte. Sono a conoscenza che la Medicina non è una scienza esatta, non può essere precisamente programmato a priori l'esatto risultato, così come le possibili complicanze, in quanto tali eventi dipendono non solo dalle tecniche impiegate ma ancor più dalle risposte dell'organismo.

Acconsento ad essere fotografata a scopo di documentazione clinica che rimarrà solo nella mia cartella clinica.

Non sono in cura con farmaci aminoglicosidi, spectinomicina o rilassanti di tipo muscolare, inoltre non soffro di miastenia, sclerosi laterale amiotrofica, disordini neuromuscolari periferici o sindrome di Eaton-Lambert.

Non mi risulta di essere allergico ad alcun farmaco o cosmetico eccetto.....

Letto, compreso e accettato il trattamento in data odierna

.....

Firma

Paziente.....

Firma del Medico.....

Casa Produttrice e lotto

.....

Giugno 2020